Prof. Dr. med. Lorenz Jäger

Radiologische Privatpraxis | Liebigstraße 20 + 24 · 35392 Gießen | Telefon: 0641 97 199 41



Informationsbogen Buscopan

Durch die Gabe von **Buscopan** (Butylscopolaminbromid) wird durch die Unterdrückung der Darmbewegung (Darmmotilität) eine bessere artefaktfreiere MRT-Bildgebung erzielt, die die diagnostische Genauigkeit der Untersuchung verbessert.

Buscopan darf nicht eingenommen werden [...]

- 1. wenn bei Ihnen mechanische Veränderungen (Stenosen) im Magen-Darm-Trakt (z. B. wegen eines Geschwulst oder durch eine Darmabknickung) vorliegen oder ein Verdacht diesbezüglich besteht oder der Darm blockiert ist im Sinne einer Darmlähmung oder Darmverschlusses (paralytischer oder obstruktiver Ileus).
- 2. bei Engwinkelglaukom («grüner Star»).
- 3. bei Harnverhalt durch mechanische Verengung der Harnwege (z. B. Vergrößerung der Vorsteherdrüse).
- 4. bei krankhaft beschleunigtem Herzschlag, Herzrasen und unregelmäßigem Herzschlag.
- 5. bei Myasthenia gravis (besondere Form von krankhafter Muskelschwäche).

In der *Schwangerschaft* sollte Buscopan nicht angewandt werden. *Stillen*: Der Übergang von Butylscopolaminbromid (Buscopan) in die Muttermilch ist nicht abschließend untersucht.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Sollten Symptome wie Müdigkeit, Schwindel oder gestörtes Nah-Sehen auftreten, dann kann die Fähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr und zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Buscopan kann zu einer Mydriasis (Weitung der Pupille) führen mit erhöhter Blendungsempfindlichkeit. Bitte führen Sie nach der Gabe von Buscopan unmittelbar kein KFZ (4 Std.).

Viele der bekannten unerwünschten Wirkungen sind auf die anticholinergen Eigenschaften [z. B. Mundtrockenheit (gehemmte Speichelbildung), erweiterte Pupillen (Akkommodationsstörung, Engwinkelglaukom), Harnverhalt, Obstipation, trockene Haut (verminderte Schweißbildung), Steigerung der Herzfrequenz] von Buscopan zurückzuführen. Diese anticholinergen Effekte sind im Allgemeinen mild und selbstlimitierend vgl. Gebrauchsinformation.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, um Wechselwirkungen und Nebenwirkungen zu vermeiden.

Ich habe die Informationen gelesen und meine Fragen sind beantwortet worden.